

Urkund Analysis Result

Analysed Document: PROYECTO ADONIS.docx (D51089891)
Submitted: 4/25/2019 11:43:00 PM
Submitted By: jposliguaf@unemi.edu.ec
Significance: 7 %

Sources included in the report:

METDOLOGIA- tesina DROGAS EN MUJERES EMBARAZADAS 1.docx (D41115074)
TESIS DE CABRERA Y TORRES. ESTADO NUTRICIONAL DEL GESTANTE.docx (D48507983)
TESIS KATHERINE POTES.docx (D48917722)
COMPLICACIONES PERINATALES POR EL CONSUMO DE DROGAS DURANTE LA GESTACION DESDE INTRODUCCION HASTA CONCLUSION.docx (D41258620)
<https://americanpregnancy.org/es/pregnancy-health/illegal-drugs-during-pregnancy/>
<https://drugfree.org/parent-blog/las-8-razones-principales-por-las-cuales-los-adolescentes-experimentan-con-drogas-y-alcohol/>
<http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/31774/1/CD-519%20Murga%20Vidal%252c%20Leslie%20Pierhina.pdf>
<https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/la-heroina-y-el-embarazo.aspx>
<https://www.ivanosalud.com/la-dependencia-de-la-heroina-en-la-mujer-y-el-embarazo/>

Instances where selected sources appear:

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

TRABAJO DE TITULACIÓN DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN ENFERMERÍA

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

TEMA: COMPLICACIONES EN EL NIÑO DEL CONSUMO MATERNO DE DROGAS DURANTE EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES

Autores: Baños Escobar Willian Israel Rodríguez Villamar Nelson Adonis

Acompañante: Esp. Posligua Fernández Julio Antonio

Milagro, Abril 2019 ECUADOR

DERECHO DE AUTOR

Ingeniero. Fabricio Guevara Viejó, PhD. RECTOR Universidad Estatal de Milagro Presente.

Yo, Rodríguez Villamar Nelson Adonis en calidad de autor y titular de los derechos morales y patrimoniales de la propuesta práctica de la alternativa de Titulación – Examen Complexivo: Investigación Documental, modalidad presencial, mediante el presente documento, libre y voluntariamente procedo a hacer entrega de la Cesión de Derecho del Autor de la propuesta practica realizado como requisito previo para la obtención de mi Título de Grado, como aporte a la Línea de Investigación SALUD PÚBLICA de conformidad con el Art. 114 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, concedo a favor de la Universidad Estatal de Milagro

una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.

Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada.

Así mismo, autorizo a la Universidad Estatal de Milagro para que realice la digitalización y publicación de esta propuesta practica en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de toda responsabilidad.

Milagro, a los 25 días del mes de Abril de 2019

_____ Firma del Estudiante Rodríguez Villamar Nelson Adonis CI:
0953347473

APROBACIÓN DEL TUTOR DE LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

Yo, POSLIGUA FERNÁNDEZ JULIO ANTONIO en mi calidad de tutor de la Investigación Documental como Propuesta práctica del Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complejo), elaborado por el estudiante BAÑOS ESCOBAR WILLIAN ISRAEL Y RODRÍGUEZ VILLAMAR NELSON ADONIS, cuyo tema de trabajo de Titulación es COMPLICACIONES EN EL NIÑO DEL CONSUMO MATERNO DE DROGAS DURANTE EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, que aporta a la Línea de Investigación SALUD PÚBLICA previo a la obtención del Grado LICENCIADO EN ENFERMERÍA; trabajo de titulación que consiste en una propuesta innovadora que contiene, como mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base conceptual, conclusiones y fuentes de consulta, considero que el mismo reúne los requisitos y méritos necesarios para ser sometido a la evaluación por parte del tribunal calificador que se designe, por lo que lo APRUEBO, a fin de que el trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de titulación de la alternativa de del Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complejo) de la Universidad Estatal de Milagro.

En la ciudad de Milagro, a los 25 días del mes de Abril de 2019.

Posligua Fernández Julio Antonio Tutor C.I.:

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR El tribunal calificador constituido por:

_____ Luego de realizar la revisión de la Investigación Documental como propuesta práctica, previo a la obtención del título (o grado académico) de Licenciado en enfermería presentado por el señor Baños Escobar Willian Israel.

Con el tema de trabajo de Titulación: "COMPLICACIONES EN EL NIÑO DEL CONSUMO MATERNO DE DROGAS DURANTE EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES"

Otorga a la presente Investigación Documental como propuesta práctica, las siguientes calificaciones: Investigación documental [] Defensa oral [] Total [] Emite el siguiente veredicto: (aprobado/reprobado) _____ Fecha: 25 de Abril de 2019.

Para constancia de lo actuado firman:

Nombres y Apellidos

Firma

Presidente _____ Secretario /a
 _____ Integrante _____

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR El tribunal calificador constituido por:

_____ Luego de realizar la revisión de la Investigación

Documental como propuesta práctica, previo a la obtención del título (o grado académico) de Licenciado en enfermería presentado por el señor Baños Escobar Willian Israel.

Con el tema de trabajo de Titulación: "COMPLICACIONES EN EL NIÑO DEL CONSUMO MATERNO DE DROGAS DURANTE EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES"

Otorga a la presente Investigación Documental como propuesta práctica, las siguientes calificaciones: Investigación documental [] Defensa oral [] Total []

Emite el siguiente veredicto: (aprobado/reprobado) _____ Fecha: 25 de Abril de 2019.

Para constancia de lo actuado firman:

Nombres y Apellidos

Firma

Presidente _____ Secretario /a

_____ Integrante _____

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO

ÍNDICE GENERAL

DERECHO DE AUTOR II APROBACIÓN DEL TUTOR DE LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL III APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR IV APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR V DEDICATORIA VI AGRADecIMIENTO VII ÍNDICE GENERAL VIII ÍNDICE DE FIGURAS XI RESUMEN 1 ABSTRACT 2 Capítulo I 4 1.1 Problema de Investigación 4 1.2 Objetivos 5 1.2.1 Objetivo General 5 1.2.2 Objetivo específicos 5 1.2.3 Justificación 6 Capítulo II. Marco Teórico Conceptual 7 2.2 Causas del consumo de drogas en adolescentes 8 2.3 Tipos de drogas consumidas por las madres adolescentes 10 2.3.1 Metanfetamina 10 2.3.2 Cocaína 10 2.3.3 Marihuana 11 2.3.4 Heroína 11 2.4 Complicaciones en el feto 12 2.5 Claves para prevenir el consumo de droga en adolescentes 12 2.6 Marco conceptual 13 2.6.1 Adicción 13 2.6.2 Adolescencia 14 2.6.3 Consumo 14 2.6.4 Complicaciones 14 2.6.5 Drogadicción 14 2.6.6 Droga 15 2.6.7 Embarazo 15 2.6.8 Familia 15 2.6.9 Feto 15 2.6.10 Madre 16 Capítulo III. Metodología 17 3.1 Método cuantitativo 17 3.2 Investigación bibliográfica documental 17 3.3 Hermenéutica 18 CAPÍTULO IV. DESARROLLO DEL TEMA 20 4.1 Complicaciones en el niño del consumo materno de drogas durante el embarazo en adolescentes 20 CONCLUSIONES 23 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 24 ANEXO 28

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Bebe prematuro por inhalación de marihuana 28 Figura 2. Microcefalia fetal por consumo de cocaína 28 Figura 3. Síndrome de abstinencia neonatal 29 Figura 4. Trastorno de espectro alcohólico fetal 29

TEMA: COMPLICACIONES EN EL NIÑO DEL CONSUMO MATERNO DE DROGAS DURANTE EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES. RESUMEN Los embarazos en mujeres adolescentes se presentan en aquellas personas cuya edad es inferior a los 18 años, indistintamente de su raza, sexo, religión, ideología política, sin embargo los índices cada día sigue aumentando en el país, y comúnmente se suscita debido a la falta de comunicación de los padres de familia sobre temas referentes a la sexología y enamoramiento. El problema llega a ser aún más crítico tanto para la madre como para el feto cuando se consume sustancias psicoactivas durante el período de gestación ocasionando perjuicios en la salud del feto tales como riesgo de aborto, bajo peso, síndrome de abstinencia, malformaciones congénitas, defecto del tubo neural, anomalía en el esófago, daños en la pared abdominal, problemas cardiovasculares, renales y urinarias. Por lo tanto el objetivo de la presente investigación es conocer las complicaciones que se pueden originar en el feto debido a la ingesta de drogas a través de la utilización de la investigación documental. Es difícil comprobar que tipo de sustancias estupefacientes ocasionan consecuencias concretas en el feto, ya que la madre adolescente puede consumir no solo un tipo de drogas sino varias, produciendo más inconvenientes en el desarrollo del gestante. Finalmente se constató que los embarazos con mayor riesgo suelen presentarse en adolescente de entre 11 a 17 años de edad, por lo tanto como conclusión es importante implementar programas y charlas comunicativas que destaquen temas referente al consumo de drogas, perjuicios y prevención. Palabras claves: Embarazo, adolescente, feto, droga, prevención.

THEME: COMPLICATIONS IN THE CHILD OF MATERNAL DRUG USE DURING PREGNANCY IN ADOLESCENTS ABSTRACT Pregnancies in adolescent women occur in those whose age is less than 18 years old, regardless of their race, sex, religion, or political ideology; however, the indexes are increasing every day in the country, and are commonly caused due to the lack of communication from parents about issues related to sexology and falling in love. The problem becomes even more critical for both the mother and the fetus when psychoactive substances are consumed during the gestation period, causing damage to the health of the fetus such as risk of miscarriage, low weight, withdrawal syndrome, congenital malformations, defect of the neural tube, anomaly in the esophagus, damage to the abdominal wall, cardiovascular, renal and urinary problems. Therefore the objective of the present investigation was to know the complications that can originate in the fetus due to the ingestion of drugs through the use of documentary research. It is difficult to verify what type of narcotic substances cause specific consequences in the fetus, since the adolescent mother can consume not only one type of drugs but several, producing more problems in the development of the pregnant woman. Finally it was found that pregnancies with higher risk usually occur in adolescents between 11 to 17 years of age, therefore in conclusion it is important to implement communication programs and talks that highlight issues related to drug use, harm and prevention. Keywords: Pregnancy, adolescent, fetus, drug, prevention.

Introducción En la actualidad, debido al desconocimiento de las consecuencias que puede conllevar al feto en el consumo de drogas por parte de las madres adolescentes genera problemas para las organizaciones de salud, por lo tanto las entidades públicas y privadas relacionadas al área médica deben promover información a través de programas o charlas comunicativas en donde se expone las causas y problemas de la ingesta de estupefacientes en periodo de gestación, ya que de esta manera se prevé alguna complicación en la vida de la madre y del feto y a su vez se disminuyen altos costos para el estado ecuatoriano. Para la Dra Eva Paris expresa que el consumo de droga

durante el estado de embarazo produce ciertos riesgos para la salud del feto

y de la madre. El aumento del riesgo de aborto, el bajo peso al nacer o el síndrome de abstinencia en el bebé son algunos de los efectos

consecuentes ocasionados por ingesta de estupefaciente. CITATION Eva19 \l 12298 (París, 2019) Durante el inicio y etapa final del embarazo es de vital importancia impartir información a todas las madres adolescentes sobre temas de cuidado personal y del feto, pero sobre todo los efectos perjudiciales que ocasiona la ingesta de drogas, logrando cumplir el objetivo primordial que es la concientización y disminución en el índice del consumo. Cabe mencionar que muchas gestantes adolescentes después de conocer los daños y perjuicios de las sustancias, terminan confesando que tipo de drogas han probado y con qué frecuencia lo realizan. El presente trabajo fue desarrollado mediante la utilización de fuentes bibliográficas, tales como revistas médicas, artículos científicos, documentales y páginas web académicas, brindando importante ayuda en la búsqueda de información acerca del consumo de drogas en las madres adolescentes y sus consecuencias en el feto. Finalmente el trabajo consta de cinco capítulos mencionados en las que se describen el problema de la investigación, marco teórico conceptual, metodologías, desarrollo del tema y conclusiones. Capítulo I 1.1 Problema de Investigación Los autores Menéndez, Álvarez & García CITATION Men18 \n \t \l 12298 (2018) detallan que el consumo de sustancias o drogas psicoactivas por parte de la mujer tiene efectos negativos para la salud, pero en caso de presentar estado de gestación se genera problemas muy graves durante el desarrollo del feto y a su vez crear dependencia en el recién nacido, provocando el Síndrome de Abstinencia Neonatal, la cual se caracteriza por un conjunto de síntomas y signos de hiperexcitabilidad debido al cese del aporte de las sustancias adictiva. Sara delgado expresa que las consecuencias que puede provocar en el feto debido al consumo de drogas se encuentra las malformaciones y defectos en cualquier parte del cuerpo entre esas se encuentra las espina bífida, atresia de esófago, ausencia de ano, ruptura de la pared abdominal, problemas cardiovasculares, problemas en los riñones. También puede originar abortos en los primeros meses de embarazos, placenta previa, anemia, dificultad para aprender entre otros. CITATION Sar16 \l 12298 (Salgado, 2016) El consumo de droga en la etapa de embarazo genera muchas complicaciones, y estas pueden presentarse en cualquier mes durante la etapa gestacional, y como consecuencia el desarrollo de nuevas enfermedades congénitas, aprendizaje, o malformaciones poniendo en riesgo la vida del feto o perjuicios en la salud del recién nacido. Se ha comprobado que el consumo de cocaína en mujeres embarazadas generan complicaciones en feto, tales como el parto prematuro, bajo peso de los neonatos, menor peso de nacimiento en 492 gramos, abortos,

disminución de talla y circunferencia craneana, toxicidad cardiovascular e hipertensión. También se ha evidenciado

efectos teratogénicos de la cocaína: Microcefalia (circunferencia bajo 2 SD del promedio), alteraciones del desarrollo prosencefálico de la línea media y de la migración neuronal (agenesia cuerpo calloso, del septum pellucidum, esquizencefalia, heterotopias neuronales), infartos cerebrales y hemorragia intracraneana (HIC). En la vida postnatal, la cocaína aumenta el riesgo de muerte súbita y se asocia

al daño neurológico y cognitivo. CITATION Hos15 \l 12298 (Hospital Clínico de la Florida, 2015)

El consumo de sustancias psicoactivas no resulta positivo para la madre adolescente, ni para el buen desarrollo del feto. Aunque el consumo de drogas sea esporádico, es importante que durante el periodo gestante no se consuma ninguna sustancia psicoactiva, incluso si se trata de pequeñas cantidades, puesto que inevitablemente repercutirá en el feto. En caso de que la madre presente una adicción, o el consumo de sustancias se mantenga en activo durante el embarazo, existe mayor probabilidad de aborto espontáneo, que nazca con bajo peso o que presente un síndrome de abstinencia neonatal.

CITATION Cen18 \l 12298 (Centro Accion, 2018) A través de la información recopilada surgió la necesidad de plantear la siguiente interrogante relacionada con el problema expuesto detallado a continuación: ¿Cuáles son las complicaciones fetales del consumo de droga en las adolescentes embarazadas? 1.2 Objetivos 1.2.1 Objetivo General Determinar las complicaciones en el niño del consumo materno de drogas durante el embarazo en adolescentes. 1.2.2 Objetivo específicos • Describir las causas del consumo de drogas en adolescentes embarazadas. • Identificar complicaciones en el inicio de ingesta de sustancias psicoactivas en adolescentes embarazadas. • Analizar el tipo de droga que consumen las adolescentes embarazadas. 1.2.3 Justificación El presente trabajo fue elaborado principalmente para conocer las complicaciones que presenta el feto, y/o recién nacido a casusa del consumo de drogas en mujeres adolescentes que se encuentran en etapa de gestación, ya que son las más vulnerables en ingerir este tipo de sustancia, sea por influencia de amistades, familiares o simplemente por conocer y/o experimentar sensaciones. Es de vital importancia promover charlas comunicativa que abarquen temas de drogadicción, el perjuicio que ocasiona en la salud tanto en la madre como en el niño y las enfermedades características como son las malformaciones congénitas, dificultad de aprendizaje, daños cerebrales, entre otros. Este tipo de proyecto debe ser efectuados en conjunto entre el especialista médico, parientes y la madre adolescente, para sí poder disminuir el alto índice de consumidoras gestantes. Cabe mencionar que la inversión en el proyecto de prevención de drogas contribuye cambios positivos a nivel social, ya que el enfoque no solo es destinado a las mujeres embarazadas sino también a aquellas adolescentes que no están en estado de gestación, y jóvenes adultas. Finalmente el proyecto de titulación proporcionó un aporte investigativo sobre las complicaciones presentadas en el niño a causa del consumo de drogas por parte de las adolescentes embarazadas.

Capítulo II. Marco Teórico Conceptual 2.1 Antecedentes históricos Las drogas o comúnmente llamadas sustancias estupefaciente han provocado dependencia por parte de los

consumidores, principalmente en los niños y adolescentes, afectando en la salud física y emocional, sin distinción de clase social, raza, religión u otro aspecto. La autora Nahikari Santana realizó una investigación documental denominada "Embarazo y hábitos tóxicos: repercusiones en el recién nacido" donde expresa que en la actualidad gran cantidad de mujeres gestantes presentan necesidad de consumir drogas para obtener sensaciones placenteras o eliminar algún tipo de dolor, convirtiendo el consumo en una drogodependencia. Por lo que el conocimiento de los criterios de sospecha es de vital importancia en la atención del recién nacido, ya que la vida media de las drogas está prolongada en el feto. Comparada con las personas adultas, las drogas originan perjuicios en el recién nacido manifestándose a través del síndrome de abstinencia neonatal, entre las 24 y 48 horas después del parto, dependiendo del tipo de droga consumida. El alcohol y el tabaco son aquellas que lideran el primer grupo de consumo de adolescentes embarazadas, mientras que en el segundo se encuentra la cocaína, los opiáceos y el cannabis. CITATION Nah15 \l 12298 (Santana, 2015) La autora María Chávez a través de su proyecto denominado "

0: COMPLICACIONES PERINATALES POR EL CONSUMO DE DROGAS DURANTE LA GESTACION DESDE INTRODUCCION HASTA CONCLUSION.docx

90%

La drogadicción en las jóvenes embarazadas con efecto al neonato de la maternidad Marianita de Jesús de la ciudad de Guayaquil "

expresa que el objetivo primordial de su investigación fue detallar cuales son las causas que contribuyen al consumir dichas sustancias y los problemas que se presentan tanto en los neonatos como en la madre. Se realizaron estudios a base de encuestas y entrevistas a profesionales expertos en el área expresan los problemas económicos, la falta de comunicación en los padres y el desconocimiento de los daños eran los motivos que llevaban a las jóvenes a ingerir este tipo de sustancias. Y las drogas que más inhalaban eran la marihuana, cocaína, y heroína. CITATION Chá15 \l 12298 (Chavez, 2015) La información descrita anteriormente se pudo observar que factores económicos, problemas familiares, desconocimiento de los diversos tipos de drogas y sus efectos dañinos en el feto contribuyen a que las madres adolescentes consuman desmedidamente, produciendo no solo problemas a nivel de salud sino para el área médica del país. 2.2 Causas del consumo de drogas en adolescentes

0: <https://drugfree.org/parent-blog/las-8-razones-principales-por-las-cuales-los-adolescentes-experimentan-con-drogas-y-alcohol/>

78%

No hay una sola razón por la cual los adolescentes usan drogas, el Dr. Neil I. Bernstein

0: <https://drugfree.org/parent-blog/las-8-razones-principales-por-las-cuales-los-adolescentes-experimentan-con-drogas-y-alcohol/>

94%

detalla algunos de los temas centrales e influencias que se encuentran detrás del consumo de drogas entre los adolescentes

mencionados a continuación: •

0: <https://drugfree.org/parent-blog/las-8-razones-principales-por-las-cuales-los-adolescentes-experimentan-con-drogas-y-alcohol/>

100%

Otras personas: Los adolescentes ven a muchas personas usando varias sustancias. Ven a sus padres y otros adultos consumiendo alcohol, fumando y, algunas veces, abusando otras sustancias. Además, con frecuencia la escena social de los adolescentes gira alrededor de beber y fumar marihuana. Algunos de los amigos se presionan entre sí para probar bebidas o fumar algo, pero es igualmente común que los adolescentes empiecen a usar alguna sustancia porque se encuentra fácilmente disponible, además de que ven a todos sus amigos disfrutándola. •

Medios de

comunicación populares: El cuarenta y siete por ciento de los adolescentes estuvieron de acuerdo en que las películas y los programas de televisión hacen que parezca que está bien usar drogas, según un estudio que se llevó a cabo en el año 2011. Entonces, no es sorprendente que los niños de 12 a 17 años de edad que vieron tres o más películas con clasificación "R" por mes, eran siete veces más propensos a fumar cigarrillos, seis veces más propensos a usar marihuana.

•

Escape y automedicación: Cuando los adolescentes se sienten infelices y no pueden encontrar una salida saludable para sus frustraciones o una persona de su confianza con quien hablar, pueden recurrir a sustancias químicas en busca de consuelo. Dependiendo de lo que usan, pueden sentirse felizmente inconscientes, maravillosamente felices o llenos de energía y confianza. Los años de la adolescencia son a menudo difíciles y pueden tener un costo emocional en los niños, a veces incluso llegando a causar depresión, así que cuando a los adolescentes se les da la oportunidad de tomar algo que los haga sentirse mejor, muchos no pueden resistir.

• Aburrimiento: Los adolescentes que no pueden tolerar estar solos, que tienen problemas manteniéndose ocupados o que anhelan las fuertes emociones, son los principales candidatos para el abuso de drogas. No solo el alcohol y la marihuana les dan algo que hacer, sino que esas sustancias ayudan a llenar el vacío interno que sienten. Es más, proporcionan una base común para interactuar con otros jóvenes similares – una manera de establecer vínculos instantáneos con un grupo de niños.

• Rebeldía: Diferentes adolescentes rebeldes eligen usar diferentes sustancias basado en sus personalidades.

La metanfetamina fomenta el comportamiento agresivo, violento, y puede ser mucho más peligrosa y potente que el alcohol. La marihuana, por otro lado, a menudo parece reducir la agresión y es más una droga de evasión. LSD y los alucinógenos también son drogas de

escape, a menudo utilizadas por los adolescentes que se sienten incomprendidos y anhelan poder escaparse a un mundo más idealista y amable.

- Gratificación instantánea: Las drogas funcionan rápidamente. Los efectos iniciales son muy buenos. Los adolescentes recurren a las drogas porque ellos las ven como un acceso directo, a corto plazo, hacia la felicidad.

- Falta de confianza: Muchos adolescentes tímidos a quienes les falta confianza indican que mientras se encuentran bajo la influencia de las drogas o del alcohol hacen cosas que de otra manera no se atreverían a hacer. Esto es parte del atractivo que tienen las drogas aun para los adolescentes que tienen confianza en sí mismos; les da el valor de pararse a bailar aunque no sean buenos bailarines, o a cantar a pleno pulmón aunque su voz sea terrible, o a atreverse a darle un beso a la chica que les gusta.

- Mala información: Quizás la causa de abuso de sustancias que más se puede evitar es la información incorrecta acerca de las drogas. Casi todos los adolescentes tienen amigos que dicen ser expertos en diversas sustancias recreativas, y que les pueden asegurar que los riesgos son mínimos.

CITATION Nei17 \l 12298 (Bernstein, 2017)

2.3 Tipos de drogas consumidas por las madres adolescentes 2.3.1 Metanfetamina

Un reciente estudio realizado por científicos de la Universidad de California en Los Ángeles ha revelado que los hijos de madres que, durante su gestación, abusaron de las metanfetaminas presentan anomalías cerebrales. El abuso de drogas y alcohol durante el embarazo afecta al desarrollo del cerebro de los fetos. Esta investigación ha mostrado el impacto potencial de una sustancia concreta: la metanfetamina, un potente psicoestimulante. Las

madres adolescentes utilizan el olfato como principal vía de inhalación de las metanfetamina, actuando a nivel del sistema nervioso central mediante la liberación de aminas e inhibición de recaptación de catecolaminas, provocando efectos deseados principales en las gestantes: incremento de energía, estado de alerta, efecto de euforia y disminución del apetito. En el feto presentan algunas alteraciones físicas tales como prematuridad, bajo peso, disminución del perímetro craneal, neuro-conductuales (irritabilidad, hipertensión y, en algunos casos, letargia y secuelas a largo plazo. El consumo de MA durante el embarazo es un problema alarmante en los países desarrollados. Sus efectos vaso constrictores contribuyen a la disfunción placentaria, y su fácil difusión a través de la barrera hemato-placentaria puede tener efectos significantes en el feto.

CITATION Man15 \l 12298 (Manzano, Lopez, Roman, García, & Mun, 2015) 2.3.2 Cocaína

El consumo de cocaína durante el embarazo puede afectar a la mujer embarazada, feto y/o recién nacidos de muchas maneras. Durante los primeros meses,

es probable que exista un aumento en el riesgo de aborto espontáneo. Cabe mencionar que la ingesta de cocaína durante todo el periodo de embarazo puede ocasionar un parto prematuro, e incluso generar daños cerebrales irreversibles a causa de accidentes cerebro vascular o la muerte del bebe. CITATION Nor16 \l 12298 (Petitjean, 2016) 2.3.3 Marihuana Algunos estudios han revelado que para las mujeres quienes fuman marihuana regularmente hay un aumento en el riesgo de nacimientos prematuros y bebés bajos en peso al nacer, circunferencia longitud y cabeza. Los bebés prematuros o bajos en peso al nacer tienen tasas más altas de muerte infantil, problemas de aprendizaje u otras incapacidades. Similar a lo que se ve

con el hábito de fumar, fumar marihuana puede aumentar los niveles de monóxido de carbono en la sangre

que puede disminuir la cantidad de oxígeno que el feto recibe y también puede afectar el crecimiento del bebé. CITATION Org15 \l 12298 (Teratología, 2015) 2.3.4 Heroína Para los autores Zafra & Díez CITATION Zaf18 \l 12298 (2018) detalla que

0: <https://www.ivanesalud.com/la-dependencia-de-la-heroina-en-la-mujer-y-el-embarazo/> 92%

los riesgos que pueden ocurrir cuando una mujer presenta un trastorno por consumo de heroína o una dependencia a éste opiáceo durante el período de gestación o embarazo

se detalla a continuación: •

0: <https://www.ivanesalud.com/la-dependencia-de-la-heroina-en-la-mujer-y-el-embarazo/> 98%

Defectos de nacimiento. Se trata de problemas de salud generales, del desarrollo o del funcionamiento del cuerpo del bebé. • Desprendimiento de la placenta. Antes del parto, la placenta se separa de la pared del útero, produciendo hemorragias que pueden resultar mortales tanto para la madre como para su bebé. • Nacimiento prematuro. Antes de 37 semanas de embarazo • Bajo peso. Peso inferior a 2,6 kg al nacer. • Síndrome de abstinencia neonatal. Se trata de exponerse a las drogas antes de nacer y tener que pasar por la abstinencia una vez nacido. • Nacimiento sin vida. Después de las 20 semanas de vida, el bebé muere en el útero. 2.4 Complicaciones en el

feto

0: <https://americanpregnancy.org/es/pregnancy-health/illegal-drugs-during-pregnancy/> 94%

Estudios han demostrado que el consumo de drogas ilegales durante el embarazo puede resultar en aborto espontáneo, bajo peso al nacer, parto prematuro, desprendimiento prematuro de placenta, muerte fetal e incluso muerte materna.

En el caso de la marihuana al ser inhalada

0: <https://americanpregnancy.org/es/pregnancy-health/illegal-drugs-during-pregnancy/>
100%

durante el embarazo puede aumentar la probabilidad de aborto espontáneo, bajo peso al nacer, nacimientos prematuros, retrasos en el desarrollo y problemas de comportamiento y aprendizaje.

La cocaína es otra de las drogas con mayor consumo en las madres adolescente, sin embargo ingerir

puede causar desprendimiento de la placenta, lo que puede dar lugar a hemorragias graves, el parto prematuro y muerte fetal. También se confirma que el riesgo de defectos de nacimiento parece ser mayor cuando la madre ha consumido cocaína con frecuencia durante el embarazo.

CITATION Aso19 \1 12298 (Asociación Americana del Embarazo, 2019) 2.5 Claves para prevenir el consumo de droga en adolescentes Existen

seis claves para prevenir las drogas en adolescentes que como padre puedes poner en práctica en la educación de tu hijo y que están asociados con un menor consumo de drogas: •

Explicación de las normas: Las familias en las que se detallan las normas y su importancia y se indica con razonamientos su utilidad tienen índices más bajos de consumo de drogas. • Vigilancia: Aquellos adolescentes que saben que sus padres están pendientes de lo que hacen tienen menos probabilidades de consumir drogas en esta etapa. • Exigencia: La vigilancia es inútil cuando se detecta algún problema

y

no se actúa. Es importante también que exista una exigencia real ante las dificultades. De no ser así el control parental no tendrá ningún efecto. • Gestión de los problemas: Una de las habilidades clave que se detectó en el estudio es la gestión de las dificultades. Tu hijo adolescente necesita ver qué haces frente a los problemas, aunque los haya causado él mismo. La figura paterna que responde genera seguridad y esto protege contra el consumo de drogas en esta etapa. • Diálogo: Lo mismo ocurre con los hijos de padres que fomentan el diálogo en familia, generando espacios apropiados para el intercambio. • Presencia en el día a día: Para un adolescente parece ser una buena referencia percibir a sus padres cercanos en su vida. Siempre debe estar presente

en las actividades que realiza incluso en las redes sociales que maneja. CITATION Fel18 \1 12298 (Martínez F. , 2018) 2.6 Marco conceptual 2.6.1 Adicción En

Fundación RECAL definimos la adicción como una enfermedad, porque el abuso de sustancias o conductas compulsivas modifica la estructura y el funcionamiento del cerebro.

La adicción destruye no solo la vida de los que la padecen sino también la de sus seres queridos. Nuestro cálculo es que cada adicto afecta a por lo menos tres vidas más, ya sea la de los padres, novio/a, esposo/a, hermanos, hijo/s, amigo/s, compañero/s de trabajo o jefe, entre otros.

CITATION Fun18 \ 12298 (Fundación Recal, 2018)

2.6.2

Adolescencia La adolescencia es el periodo de la vida marcado por el final de la infancia y la aparición de la pubertad. Es un periodo de transformación donde hay múltiples cambios físicos como la aparición de caracteres sexuales secundarios y psicológicos como el característico comportamiento impulsivo y cambios frecuentes en el estado

de ánimo. CITATION Tua15 \ 12298 (Tuadolescente.com, 2015)

2.6.3 Consumo

Consumo es la acción de utilizar y/o gastar un producto, un bien o un servicio para atender necesidades humanas tanto primarias como secundarias. En economía, se considera el consumo como la fase final del proceso productivo, cuando el bien obtenido es capaz de servir de utilidad al consumidor.

CITATION Jav19 \ 12298 (Montes, 2019)

2.6.4 Complicaciones

Agravamiento de una enfermedad o de un procedimiento médico con una patología intercurrente, que aparece espontáneamente con una relación causal más o menos directa con el diagnóstico o el tratamiento aplicado.

CITATION Uni191 \ 12298 (Universidad de Navarra, 2019)

2.6.5 Drogadicción

La adicción a las drogas, que también se conoce como «trastorno por consumo de sustancias», es una enfermedad que afecta el cerebro y el comportamiento de una persona, y produce incapacidad de controlar el consumo de medicamentos o drogas legales o ilegales. Las sustancias como el alcohol, la marihuana y la nicotina también se consideran drogas. Cuando eres adicto, posiblemente sigas consumiendo la droga a pesar del daño que causa.

CITATION May18 \ 12298 (Mayo Clinic, 2018)

2.6.6 Droga

Droga es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración

produce una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es, además susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. CITATION Jul12 \1 12298 (Sagñay, 2012)

2.6.7

Embarazo El embarazo consiste en aproximadamente 40 semanas contando desde el primer día de tu último período menstrual. Se agrupan las semanas en tres trimestres.

CITATION Off19 \1 12298 (Office on Women Health, 2019)

2.6.8 Familia

La familia puede estar integrada por diversos miembros y no todos consanguíneos; por tanto, pueden identificarse varios tipos. "La familia es uno de los pilares de la sociedad", puede leerse en la web de la ONU, en su sección de Temas Mundiales. Por su parte, la Real Academia Española la define como "grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas" o cómo "conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje".

CITATION Von15 \1 12298 (Lara, 2015) 2.6.9

Feto El embrión recibe el nombre de feto tras haber alcanzado un determinado nivel de desarrollo de los órganos (a las ocho semanas después de la concepción), hasta el momento en que se produzca el nacimiento. El desarrollo del feto varía cada semana y cada mes de embarazo. Durante la vida fetal no se forman órganos o tejidos nuevos, sino que se produce la maduración de los ya existentes.

CITATION Ina19 \1 12298 (Inatal, 2019) 2.6.10 Madre

Una madre es "una mujer o animal hembra que ha parido a otro ser de su misma especie".

Madre es una definición insuficiente que se quiere cambiar

Ser madre no se limita solo concebir y dar a luz, porque hay mujeres que son madres sin concebir ni parir. Ser madre no es limitarse a cumplir con unas "funciones" asociadas tradicionalmente al concepto de madre, sea cual sea, porque hay madres que rompen esa definición y aun así son madres.

CITATION Noe19 \1 12298 (Fernández, 2019)

Capítulo III. Metodología En la presente investigación documental se utilizó el método cuantitativo, permitiendo conocer el índice estadístico (%) de mujeres adolescentes que consumen drogas en el Ecuador, edad, tipo de sustancias entre otros. La investigación bibliográfica fue de vital importancia en todo el trabajo, ya que se obtuvo información sobre las complicaciones en el feto, drogas y otras terminologías mediante el uso de monografías, tesis doctorales de los distintos repositorios de las universidades nacionales e internacionales,

artículos científicos, revistas médicas tales como redalyc, scielo, páginas web, diccionarios médicos y blogs. Y Finalmente a través de la teoría hermenéutica se hizo la revisión de trabajos textuales de distintos autores, para su posterior análisis e interpretación, logrando efectuar una estructura en el desarrollo del proyecto, redactando nuevas teorías sin alterar las opiniones de los autores principales. Cabe mencionar que el trabajo de titulación es de carácter investigativo, tomando e incorporando las ideas relevantes de cada autor. La utilización de los métodos detallados anteriormente permitieron recopilar información efectuando un análisis al objeto de estudio, en este caso las complicaciones que se presentan en el feto o recién nacido debido al consumo de diversas sustancias psicoactivas por parte de las mujeres embarazadas. Dichas fuentes de información fueron tomadas desde el período 2015 hasta el presente año.

CAPÍTULO IV. DESARROLLO DEL TEMA 4.1 Complicaciones en el niño del consumo materno de drogas durante el embarazo en adolescentes El autor Kevin López CITATION Kev16 \n \t \l 12298 (2016) detalla que el consumo de drogas psicoactivas hoy en día representa un problema nacional tanto para el estado ecuatoriano como en la salud pública, y estas

0: TESIS KATHERINE POTES.docx

89%

atravesan la placenta por difusión pasiva, logrando ejercer su toxicidad sobre el feto. El tipo y magnitud del daño

siempre van a depender de

0: TESIS KATHERINE POTES.docx

100%

las drogas consumidas, vía utilizada, dosis y duración del consumo, así como la etapa del embarazo en el cual ocurre la exposición.

Dichas sustancias ocasionan complicaciones maternas agudas y graves, y el problema puede ser aún mayor si intervienen

0: METDOLOGIA- tesina DROGAS EN MUJERES EMBARAZADAS 1.docx

100%

otros factores dependientes de la persona (psicopatología, comorbilidad psiquiátrica) y del entorno

que las rodea (situaciones ambientales desagradables), entre esos tenemos: el síndrome de abstinencia, la cual repercute en el recién nacido a pocas horas o pocos días después del nacimiento. También pueden adquirir enfermedades infecciosas por vía transplacentario tales como hepatitis, sífilis, VIH, y otras más como problemas de aprendizaje, control, modulación de estados conductuales, desarrollo social, emocional, y motora. El consumo de droga provoca daños que afectan los distintos sistemas del cuerpo humano (inmunológico, respiratorio, digestivo, urinario, entre otros) perjudicando no solo a la madre adolescente, sino también al feto, o recién nacido, y en muchos casos provocar abortos prematuros. 4.2

Complicaciones Prenatales por Consumo De Drogas La autora Gabriela Barahona CITATION Gab18 \n \t \l 12298 (2018) detalla que las complicaciones prenatales suelen originarse debido al consumo de drogas, o la mezcla de cada una de ellas. Por lo tanto a continuación se procede a describir los efectos negativo que repercute en el feto y/o recién nacido: • Anormalidades en

0: TESIS DE CABRERA Y TORRES. ESTADO NUTRICIONAL DEL GESTANTE.docx

69%

el crecimiento fetal, adaptación adecuada del Recién Nacido a la vida extrauterina o en el desarrollo posterior del niño

a causa de la droga administrada por la madre adolescente. •

0: COMPLICACIONES PERINATALES POR EL CONSUMO DE DROGAS DURANTE LA GESTACION DESDE INTRODUCCION HASTA CONCLUSION.docx

82%

Morbilidad por supresión, por intoxicación, por modo de uso de la droga y morbilidad por modo de vida de la madre. •

Anormalidades bioquímicas o fisiológicas en el feto debido a la teratogenicidad. • Intoxicación o sobredosis aguda • Síndrome de abstinencia • Alteraciones en el neurodesarrollo • Síndrome de muerte súbita del lactante • Retardo del crecimiento posnatal • Dimorfismo facial 4.3 Complicaciones del feto por consumo de marihuana

Los médicos advierten que los efectos de la marihuana en la salud del feto siguen sin estar claros, pero podrían incluir bajo peso al nacer y problemas de desarrollo,

según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

de Estados Unidos. Muchos de los químicos en la marihuana, como el tetrahidrocannabinol, conocido como THC, pueden pasar a su bebé a través del sistema de la madre.

CITATION Els17 \l 12298 (El sol del centro, 2017) Algunos datos informativos detallan que madres adolescentes expresan haber consumido marihuana para calmar sensaciones de náusea, tensión elevada, sin embargo aunque la cantidad sea poco tiende acumular efectos negativos en el feto y crear drogodependencia (ver Figura 1).

4.4 Complicaciones del feto por consumo de Cocaína La autora Leslie Murga CITATION Les18 \n \t \l 12298 (2018) detalla que, al momento que las adolescentes gestantes ingieren cocaína, esta droga se distribuye por medio de la leche materna, hasta presentar metabolitos en el pelo del recién nacido. También

presentan malformaciones fetales que afectan a casi todos los sistemas principalmente cardiovasculares genitourinario, digestivas, de los miembros y del cráneo fetal.

0: <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/31774/1/CD-519%20Murga%20Vidal%252c%20Leslie%20Pierhina.pdf> 88%

Las

complicaciones obstétricas son numerosas, pero dependen fundamentalmente de la dosis administrada, la edad gestacional y de la duración de la exposición, ya que se estima que la gestante expuesta al consumo de ésta droga tiene seis veces más probabilidades de presentar alguna complicación

en el embarazo. (Ver Figura 2) 4.5 Complicaciones del feto por consumo de Heroína

0: <https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/la-heroina-y-el-embarazo.aspx> 100%

Consumir heroína durante el embarazo puede ser peligroso e incluso mortal, causando los siguientes problemas detallados a continuación • Defectos de nacimiento:

0: <https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/la-heroina-y-el-embarazo.aspx> 100%

Los defectos de nacimiento cambian la forma o función de una o más partes del cuerpo. •

Desprendimiento placentario:

0: <https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/la-heroina-y-el-embarazo.aspx> 100%

La placenta se separa de la pared del útero antes del parto, ocasionado un grave

0: METDOLOGIA- tesina DROGAS EN MUJERES EMBARAZADAS 1.docx 70%

sangrado muy intenso siendo mortal para la mamá y el bebé • Nacimiento prematuro: Sucede antes de las 37 semanas de embarazo. • Bajo peso al nacer: El bebe nace

con un menor de 5

libras y 8 onzas. • Síndrome de abstinencia neonatal:

Sucede cuando el bebé es expuesto a una droga en la matriz antes de nacer y luego pasa por la abstinencia de la droga después del nacimiento. • Nacimiento sin vida: El bebé muere en el útero antes de nacer, después de las 20 semanas de embarazo. • Síndrome de muerte súbita infantil o del lactante: Es la muerte inexplicada del bebé cuando duerme.

CITATION Nac16 \1 12298 (Nacer Sano, 2016) (ver Figura3) 4.6 Complicaciones del feto por

consumo de Alcohol El consumo de alcohol durante el embarazo puede causar defectos de nacimiento y discapacidades en el bebé. Estas afecciones, conocidas como trastornos del espectro alcohólico fetal (TEAF) figuran entre las principales causas prevenibles de defectos de nacimiento y discapacidades del desarrollo. Los TEAF (Trastornos del espectro alcohólico fetal) pueden causar problemas en la manera como luce, crece, aprende y actúa una persona. También pueden causar defectos de nacimiento en el corazón, el cerebro y otros órganos importantes. Estos problemas duran toda la vida.

CITATION Cen171 \l 12298 (Centro para el control y prevención de enfermedades, 2017) (Ver Figura 4)

CONCLUSIONES Las presentes conclusiones fueron detalladas en bases a la investigación realizada: • El consumo de drogas ocasionado por las adolescentes gestantes genera diversas complicaciones en el feto y/o recién nacido, perjudicando la salud interna, externa y de aprendizaje tales como malformaciones congénitas, partos prematuros, abortos espontáneos, síndrome de abstinencia fetal, enfermedades infecciosas, dimorfismo facial, trastornos estructurales, funcionales, sufrimiento fetal, muerte del feto y de la madre. • Las madres adolescentes consumen sustancias psicoactivas por muchas causas, entre las más principales se destaca, abandono del padre del recién nacido, crisis económica, problemas personales, problemas psicológicos, separación de los padres, falta de conocimiento del tema, falta de comunicación entre la familia, adicción, curiosidad, preocupaciones, aburrimiento, entre otros.

• A nivel nacional las madres adolescentes consumen diversos tipos de drogas, sin embargo la marihuana tiene una mayor acogida por parte de las gestantes presentando un 9,58%, seguida de la heroína con un 3,01%, tabaco en un 10,77%, cocaína con el 3,02% y pasta base en un 1,86%.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asociación Americana del Embarazo. (2019). Asociación Americana del Embarazo. Obtenido de Asociación Americana del Embarazo: <https://americanpregnancy.org/es/pregnancy-health/illegal-drugs-during-pregnancy/> Barahona, G. (2018). COMPLICACIONES MATERNO FETALES EN GESTANTES DROGODEPENDIENTES, EN PACIENTES ENTRE 16 Y20 AÑOSDE EDAD. Guayaquil: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. Bernstein, N. (2 de Enero de 2017). Partnership. Obtenido de Partnership: <https://drugfree.org/parent-blog/las-8-razones-principales-por-las-cuales-los-adolescentes-experimentan-con-drogas-y-alcohol/>
- Canaan, R. (2019). Lifeder. Obtenido de Lifeder: <https://www.lifeder.com/tipos-metodos-de-investigacion/> Centro para el control y prevención de enfermedades. (4 de Agosto de 2017). Centro para el control y prevención de enfermedades. Obtenido de Centro para el control y prevención de enfermedades: <https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/fasd/alcohol-use.html> Centro Accion. (17 de Septiembre de 2018). Centro Accion. Obtenido de Centro Accion: <https://centroaccion.es/consumo-drogas-durante-embarazo/> Chavez, M. (2015). Repositorio de la

Universida de Guayaquil. Obtenido de Repositorio de la Universida de Guayaquil. El sol del centro. (26 de Diciembre de 2017). El sol del centro. Obtenido de El sol del centro: <https://www.elsoldelcentro.com.mx/doble-via/salud/incrementa-el-consumo-de-marihuana-por-embarazadas-en-california-545985.html> El cerebro de niños y adolescentes. (26 de Enero de 2016). El cerebro de niños y adolescentes. Obtenido de El cerebro de niños y adolescentes: <http://cerebroniad.blogspot.com/2016/01/efectos-del-consumo-de-drogas-durante.html> Fernández, N. (2019). Hacer Familia. Obtenido de Hacer Familia: <https://www.hacerfamilia.com/familia/madre-definicion-insuficiente-rae-madre-20170607131737.html> Fundación Recal. (2018). Clínica de Tratamiento de Adicciones. Obtenido de Clínica de Tratamiento de Adicciones: <https://www.fundacionrecal.org/que-es-la-adiccion/> Guía de tesis. (19 de Agosto de 2019). Guía de tesis. Obtenido de Guía de tesis: <https://guiadetesis.wordpress.com/tag/investigacion-bibliografica-y-documental/> Hospital Clínico de la Florida. (2015). Guía Perinatal 2015. Obtenido de Guía Perinatal 2015: <https://cedipcloud.wixsite.com/minsal-2015/drogas--embarazo> Inatal. (19 de Marzo de 2019). Inatal. Obtenido de Inatal: <https://inatal.org/el-embarazo/enciclopedia/65-feto.html> Lara, V. (15 de Diciembre de 2015). Hipertextual. Obtenido de Hipertextual: <https://hipertextual.com/2015/12/tipos-familia> Lopez, K. (2016). MBARAZO EN MUJERES CONSUMIDORAS DE DROGAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL. AÑO 2014-2015. Guayaquil: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. Manzano, Lopez, Roman, García, & Mun. (Mayo de 2015). Anales de Pediatría. Obtenido de Anales de Pediatría: <https://www.analesdepediatria.org/es-exposicion-prenatal-metanfetamina-shabu-articulo-S169540331630203X> Martínez, F. (20 de Abril de 2018). Padres en la nube. Obtenido de Padres en la nube: <https://padresenlanube.com/6-claves-para-prevenir-las-drogas-en-adolescentes/> Martínez, Y. (18 de Marzo de 2010). Tendencia21. Obtenido de Tendencia21: https://www.tendencias21.net/notes/El-consumo-de-metanfetamina-durante-el-embarazo-produce-danos-cerebrales-en-los-fetos_b1950321.html Mayo Clinic. (21 de Febrero de 2018). Mayo Clinic. Obtenido de Mayo Clinic: <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/drug-addiction/symptoms-causes/syc-20365112> Menendez, Alvarez, & García. (2018). Sustancias adictivas y embarazo: Cuidados de enfermería a la mujer embarazada y al recién nacido para minimizar sus efectos. Enfermería Comunitaria. Montes, J. (2019). Economipedia . Obtenido de Economipedia : <https://economipedia.com/definiciones/consumo.html> Murga, L. (2018).

CORRELACIÓN DE EFECTOS Y CONSECUENCIAS ENTRE EL CONSUMO DE MARIHUANA O COCAÍNA EN GESTANTES ADOLESCENTES.

Guayaquil: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. Obtenido de <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/31774/1/CD-519%20Murga%20Vidal%2c%20Leslie%20Pierhina.pdf> Nacer Sano. (Julio de 2016). Nacer Sano. Obtenido de Nacer Sano: <https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/la-heroina-y-el-embarazo.aspx> Office on Women Health. (18 de abril de 2019). Office on Women Health. Obtenido de Office on Women Health: <https://espanol.womenshealth.gov/pregnancy/youre-pregnant-now-what/stages-pregnancy> París, E. (2019). Bebe y Mas. Obtenido de Bebe y Mas: <https://www.bebesymas.com/salud-de-la-madre/como-afectan-las-drogas-al-embarazo-y-al-bebe> Petitjean, N. (26 de Enero de 2016). El Cerebro de Niños y Adolescentes. Obtenido de El Cerebro de Niños y Adolescentes: <http://cerebroniad.blogspot.com/2016/01/efectos-del-consumo-de-drogas-durante.html>

Recursosenprojectmanagement. (2019). Recursosenprojectmanagement. Obtenido de Recursosenprojectmanagement: <https://www.recursosenprojectmanagement.com/metodologia-proceso-y-herramientas/> Salgado, S. (28 de Julio de 2016). Reproducción asistida Org. Obtenido de Reproducción asistida Org: <https://www.reproduccionasistida.org/embarazo-drogas/> Santana, N. (2015). Embarazo y hábitos tóxicos: repercusiones en el recién nacido. Universidad de La Laguna. Teratología, O. d. (2015). Marihuana. MotherToBaby, 2. Tuadolescente.com. (18 de Junio de 2015). Tuadolescente.com. Obtenido de Tuadolescente.com: <http://tuadolescente.com/definicion-de-adolescencia/> Universidad de Navarra. (2019). Universidad de Navarra. Obtenido de Universidad de Navarra: <https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/complicacion> Zafra, A., & Díez, C. (24 de Enero de 2018). Ivane Salud. Obtenido de Ivane Salud: <https://www.ivanesalud.com/la-dependencia-de-la-heroina-en-la-mujer-y-el-embarazo/>

ANEXO

Figura 1. Bebe prematuro por inhalación de marihuana Fuente: CITATION Red18 \l 12298 (Democracia, 2018)

Figura 2. Síndrome de Abstinencia por consumo de heroína Fuente: CITATION Elc16 \l 12298 (El cerebro de niños y adolescentes, 2016)

Figura 3. Síndrome de abstinencia neonatal Fuente: CITATION Sín19 \l 12298 (Síndromede, 2019)

Figura 4. Trastorno de espectro alcohólico fetal Fuente: CITATION Fet18 \l 12298 (Program, 2018)

I

29

Hit and source - focused comparison, Side by Side:

Left side: As student entered the text in the submitted document.

Right side: As the text appears in the source.

Instances from: METDOLOGIA- tesina DROGAS EN MUJERES EMBARAZADAS 1.docx

11

100%

otros factores dependientes de la persona (psicopatología, comorbilidad psiquiátrica) y del entorno

11: METDOLOGIA- tesina DROGAS EN MUJERES EMBARAZADAS 1.docx 100%

otros factores dependientes de la persona (psicopatología, comorbilidad psiquiátrica) y del entorno (

18

70%

sangrado muy intenso siendo mortal para la mamá y el bebé •
Nacimiento prematuro: Sucede antes de las 37 semanas de embarazo. • Bajo peso al nacer: El bebe nace

18: METDOLOGIA- tesina DROGAS EN MUJERES EMBARAZADAS 1.docx 70%

sangrado muy intenso y puede ser mortal para la mamá y el bebé. • Nacimiento prematuro es el que sucede demasiado temprano, antes de las 37 semanas de embarazo. • Bajo peso al nacer, sucede cuando el bebé nace

Instances from: TESIS DE CABRERA Y TORRES. ESTADO NUTRICIONAL DEL GESTANTE.docx

12

69%

el crecimiento fetal, adaptación adecuada del Recién Nacido a la vida extrauterina o en el desarrollo posterior del niño

12: TESIS DE CABRERA Y TORRES. ESTADO NUTRICIONAL DEL GESTANTE.docx

69%

el normal crecimiento fetal, en la adaptación del recién nacido a la vida extrauterina con manifestación de síndrome de deprivación o, incluso, en el normal desarrollo posterior del niño.

Instances from: TESIS KATHERINE POTES.docx

9 89%

atraviesan la placenta por difusión pasiva, logrando ejercer su toxicidad sobre el feto. El tipo y magnitud del daño

9: TESIS KATHERINE POTES.docx 89%

atraviesan la placenta por difusión pasiva, pudiendo así ejercer su toxicidad sobre el feto. El tipo y magnitud del daño

10 100%

las drogas consumidas, vía utilizada, dosis y duración del consumo, así como la etapa del embarazo en el cual ocurre la exposición.

10: TESIS KATHERINE POTES.docx 100%

las drogas consumidas, vía utilizada, dosis y duración del consumo, así como la etapa del embarazo en el cual ocurre la exposición.

Instances from: COMPLICACIONES PERINATALES POR EL CONSUMO DE DROGAS DURANTE LA GESTACION DESDE INTRODUCCION HASTA CONCLUSION.docx

1 90%

La drogadicción en las jóvenes embarazadas con efecto al neonato de la maternidad Marianita de Jesús de la ciudad de Guayaquil "

1: COMPLICACIONES PERINATALES POR EL CONSUMO DE DROGAS DURANTE LA GESTACION DESDE INTRODUCCION HASTA CONCLUSION.docx 90%

La drogadicción en las jóvenes embarazadas con efecto en el neonato en la maternidad marianita de Jesús de la ciudad de Guayaquil,

13 82%

Morbilidad por supresión, por intoxicación, por modo de uso de la droga y morbilidad por modo de vida de la madre. •

13: COMPLICACIONES PERINATALES POR EL CONSUMO DE DROGAS DURANTE LA GESTACION DESDE INTRODUCCION HASTA CONCLUSION.docx 82%

morbilidad por supresión, morbilidad por modo de uso de la droga y morbilidad por modo de vida de la madre. [2.]

Instances from: <https://americanpregnancy.org/es/pregnancy-health/illegal-drugs-during-pregnancy/>

7 94%

Estudios han demostrado que el consumo de drogas ilegales durante el embarazo puede resultar en aborto espontáneo, bajo peso al nacer, parto prematuro, desprendimiento prematuro de placenta, muerte fetal e incluso muerte materna.

7: <https://americanpregnancy.org/es/pregnancy-health/illegal-drugs-during-pregnancy/> 94%

estudios han demostrado que el consumo de drogas ilegales durante el embarazo puede resultar en aborto espontáneo, bajo peso al nacer, parto prematuro, desprendimiento prematuro de placenta, muerte fetal y incluso muerte materna.

8 100%

durante el embarazo puede aumentar la probabilidad de aborto espontáneo, bajo peso al nacer, nacimientos prematuros, retrasos en el desarrollo y problemas de comportamiento y aprendizaje.

8: <https://americanpregnancy.org/es/pregnancy-health/illegal-drugs-during-pregnancy/> 100%

durante el embarazo puede aumentar la probabilidad de aborto espontáneo, bajo peso al nacer, nacimientos prematuros, retrasos en el desarrollo y problemas de comportamiento y aprendizaje. • ¿

Instances from: <https://drugfree.org/parent-blog/las-8-razones-principales-por-las-cuales-los-adolescentes-experimentan-con-drogas-y-alcohol/>

2 78%

No hay una sola razón por la cual los adolescentes usan drogas, el Dr. Neil I. Bernstein

2: <https://drugfree.org/parent-blog/las-8-razones-principales-por-las-cuales-los-adolescentes-experimentan-con-drogas-y-alcohol/> 78%

No hay solo una razón por la cual los adolescentes usan drogas y consumen alcohol. El Dr. Neil I. Bernstein

3 94%

detalla algunos de los temas centrales e influencias que se encuentran detrás del consumo de drogas entre los adolescentes

3: <https://drugfree.org/parent-blog/las-8-razones-principales-por-las-cuales-los-adolescentes-experimentan-con-drogas-y-alcohol/> 94%

detalla algunos de los temas centrales e influencias que se encuentran detrás del consumo de drogas y alcohol entre los adolescentes.

4 100%

Otras personas: Los adolescentes ven a muchas personas usando varias sustancias. Ven a sus padres y otros adultos consumiendo alcohol, fumando y, algunas veces, abusando otras sustancias. Además, con frecuencia la escena social de los adolescentes gira alrededor de beber y fumar marihuana. Algunos de los amigos se presionan entre sí para probar bebidas o fumar algo, pero es igualmente común que los adolescentes

4: <https://drugfree.org/parent-blog/las-8-razones-principales-por-las-cuales-los-adolescentes-experimentan-con-drogas-y-alcohol/> 100%

Otras personas — Los adolescentes ven a muchas personas usando varias sustancias. Ven a sus padres y otros adultos consumiendo alcohol, fumando y, algunas veces, abusando otras sustancias. Además, con frecuencia la escena social de los adolescentes gira alrededor de beber y fumar marihuana.

empiecen a usar alguna sustancia porque se encuentra fácilmente disponible, además de que ven a todos sus amigos disfrutándola. •

Algunos de los amigos se presionan entre sí para probar bebidas o fumar algo, pero es igualmente común que los adolescentes empiecen a usar alguna sustancia porque se encuentra fácilmente disponible, además de que ven a todos sus amigos disfrutándola.

Instances from: <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/31774/1/CD-519%20Murga%20Vidal%252c%20Leslie%20Pierhina.pdf>

14

88%

Las

complicaciones obstétricas son numerosas, pero dependen fundamentalmente de la dosis administrada, la edad gestacional y de la duración de la exposición, ya que se estima que la gestante expuesta al consumo de ésta droga tiene seis veces más probabilidades de presentar alguna complicación

14: <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/31774/1/CD-519%20Murga%20Vidal%252c%20Leslie%20Pierhina.pdf> 88%

Las complicaciones obstétricas son numerosas, pero dependen fundamentalmente de la dosis administrada, la edad gestacional y de la duración de la exposición, se estima que la gestante expuesta al consumo de ésta droga tiene 6 veces más probabilidades de presentar alguna complicación

Instances from: <https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/la-heroina-y-el-embarazo.aspx>

15 100%

Consumir heroína durante el embarazo puede ser peligroso e incluso mortal,

15: <https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/la-heroina-y-el-embarazo.aspx> 100%

Consumir heroína durante el embarazo puede ser peligroso e incluso mortal.

16 100%

Los defectos de nacimiento cambian la forma o función de una o más partes del cuerpo. •

16: <https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/la-heroina-y-el-embarazo.aspx> 100%

Los defectos de nacimiento cambian la forma o función de una o más partes del cuerpo.

17 100%

La placenta se separa de la pared del útero antes del parto,

17: <https://nacersano.marchofdimes.org/embarazo/la-heroina-y-el-embarazo.aspx> 100%

la placenta se separa de la pared del útero antes del parto.

Instances from: <https://www.ivanesalud.com/la-dependencia-de-la-heroina-en-la-mujer-y-el-embarazo/>

5 92%

los riesgos que pueden ocurrir cuando una mujer presenta un trastorno por consumo de heroína o una dependencia a éste opiáceo durante el período de gestación o embarazo

5: <https://www.ivanesalud.com/la-dependencia-de-la-heroina-en-la-mujer-y-el-embarazo/> 92%

los riesgos que pueden ocurrir cuando se una mujer presente un trastorno por consumo de heroína o una dependencia a éste opiáceo durante el período de gestación o embarazo: •

6 98%

Defectos de nacimiento. Se trata de problemas de salud generales, del desarrollo o del funcionamiento del cuerpo del bebé. • Desprendimiento de la placenta. Antes del parto, la placenta se separa de la pared del útero, produciendo hemorragias que pueden resultar mortales tanto para la madre como para su bebé. • Nacimiento prematuro. Antes de 37 semanas de embarazo • Bajo peso. Peso inferior a 2,6 kg al nacer. • Síndrome de abstinencia neonatal. Se trata de exponerse a las drogas antes de nacer y tener que pasar por la abstinencia una vez nacido. • Nacimiento sin vida. Después de las 20 semanas de vida, el bebé muere en el útero. 2.4 Complicaciones en el

6: <https://www.ivanesalud.com/la-dependencia-de-la-heroina-en-la-mujer-y-el-embarazo/> 98%

Defectos de nacimiento. Se trata de problemas de salud generales, del desarrollo o del funcionamiento del cuerpo del bebé. • Desprendimiento de la placenta. Antes del parto, la placenta se separa de la pared del útero, produciendo hemorragias que pueden resultar mortales tanto para la madre como para su bebé. • Nacimiento prematuro. Antes de 37 semanas de embarazo • Bajo peso. Peso inferior a 2,6 kg al nacer. • Síndrome de abstinencia neonatal. Se trata de exponerse a las drogas antes de nacer y tener que pasar por la abstinencia una vez nacido. • Nacimiento sin vida. Después de las 20 semanas de vida, el bebé muere en el útero. aproximadamente, el 50%