



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

**UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  
FACULTAD DE POSGRADO**

**VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**

**ARTÍCULOS PROFESIONALES DE ALTO NIVEL  
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:**

**MAGÍSTER EN PSICOLOGÍA CLÍNICA CON MENCIÓN EN  
ATENCIÓN EN EMERGENCIAS Y DESASTRES**

**TEMA:**

**Trastorno De Estrés Postraumático En Mujeres Víctimas De Violencia Sexual  
Del Consultorio Psicológico De Portoviejo.**

**Autor:** Sandy Lilibeth Navarrete Mera

**Tutor:** María Noemi Anchundia Mendoza

*Milagro, 2026*

## Post-traumatic stress disorder in women victims of sexual violence at the Portoviejo Psychological Clinic

### Trastorno De Estrés Postraumático En Mujeres Víctimas De Violencia Sexual Del Consultorio Psicológico De Portoviejo.

#### Autores:

Navarrete Mera Sandy Lilibeth  
Universidad Estatal De Milagro  
Maestrante de Psicología Clínica Mención en Atención  
en Emergencias y Desastres  
Portoviejo – Ecuador



snavarrem3@unemi.edu.ec



<https://orcid.org/0009-0009-4824-7647>

Mgr. Anchundia Mendoza María Noemi  
Universidad Estatal de Milagro  
Docente de la Facultad de Educación, Ecuador.  
Milagro – Ecuador



malchundiam@unemi.edu.ec



<https://orcid.org/0000-0002-5619-3660>

Fechas de recepción: 01-mes-202? aceptación: 15-mes-202? publicación: 15-mes-202?



<https://orcid.org/0000-0002-8695-5005>

<http://mqrinvestigar.com/>

## Resumen

La violencia sexual es una experiencia altamente traumática que puede tener graves consecuencias para la salud mental de las mujeres, incluyendo el desencadenamiento de síntomas de trastorno de estrés postraumático. Este estudio tuvo como objetivo analizar los síntomas de TEPT de mujeres víctimas de violencia sexual que recibieron atención psicológica, la relación entre estos síntomas y su impacto percibido. Se desarrolló una investigación con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal, y alcance descriptivo-correlacional. La muestra del estudio consistió en mujeres víctimas de violencia sexual atendidas en el consultorio psicológico. Para la recopilación de datos utilizó el PCL-5 y una encuesta diseñada por el investigador para evaluar el impacto psicológico percibido. El análisis de datos empleó métodos estadísticos descriptivos e inferenciales. Los resultados constataron la presencia de síntomas asociados al estrés postraumático en la mayoría de las participantes, con variabilidad en la intensidad de los síntomas, así como una relación entre el impacto psicológico percibido y la manifestación de dicha sintomatología. En conclusión, la violencia sexual genera un impacto psicológico significativo, lo que acentúa la importancia de una evaluación e intervención psicológica adecuada en mujeres víctimas de violencia sexual.

**Palabras claves:** Estrés postraumático; mujeres; violencia sexual; impacto psicológico.

## Abstract

Sexual violence is a highly traumatic experience that can have serious consequences for women's mental health, including triggering symptoms of post-traumatic stress disorder. This study aimed to analyze PTSD symptoms in women victims of sexual violence who received psychological care, the relationship between these symptoms and their perceived impact. A quantitative, non-experimental, cross-sectional study with a descriptive-correlational approach was conducted. The study sample consisted of women who were victims of sexual violence and were treated at a psychological clinic. Data were collected using the PCL-5 and a survey designed by the researcher to assess perceived psychological impact. Data analysis employed descriptive and inferential statistical methods. The results confirmed the presence of symptoms associated with post-traumatic stress in most of the participants, with variability in the intensity of the symptoms, as well as a relationship between the perceived psychological impact and the manifestation of these symptoms. In conclusion, sexual violence generates a significant psychological impact, which highlights the importance of adequate psychological assessment and intervention in women who are victims of sexual violence.

**Keywords:** post-traumatic stress; women; sexual violence; psychological impact.

## Introducción

La violencia sexual dirigida a las mujeres representa una de las formas más graves de violación de los derechos humanos y es actualmente un problema de salud pública persistente a nivel global, este tipo de violencia impacta directamente en la salud física y mental de las víctimas, sus consecuencias pueden extenderse durante toda la vida. Informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022) especifican que la violencia sexual genera un impacto significativo en la salud mental de las mujeres, incrementando el riesgo de desarrollar enfermedades mentales graves y duraderas

Una de las repercusiones psicológicas más frecuentes derivadas de la violencia sexual es el trastorno de estrés postraumático (TEPT), el cual se manifiesta como respuesta a la exposición de un evento traumático que representa una amenaza real o percibida para la salud mental y física. Los síntomas del TEPT incluyen recuerdos intrusivos, pesadillas, evitación persistente de estímulos relacionados con el trauma, hipervigilancia, alteraciones del estado de ánimo y disfunción personal y social. La evidencia clínica sugiere que estos síntomas pueden prolongarse y agravarse en mujeres que han sido víctimas de violencia sexual si no reciben tratamiento psicológico oportuno (Bisson et al., 2023).

Múltiples estudios han confirmado que la violencia sexual es uno de los acontecimientos traumáticos con mayor riesgo de desencadenar trastorno de estrés postraumático en mujeres. La agresión sexual no solo causa un profundo trauma emocional, sino que también altera los sistemas biológicos y neuropsicológicos relacionados con la regulación del estrés, lo que aumenta el riesgo de desarrollar y persistir síntomas postraumáticos (D'Elia et al., 2022). Estas manifestaciones pueden ir acompañadas de ansiedad, depresión, alteraciones del sueño e intensos sentimientos de culpa y vergüenza, lo que afecta considerablemente la calidad de vida de la víctima.

A pesar de la gravedad de estas consecuencias, gran cantidad de mujeres aún enfrentan barreras sociales, culturales e institucionales para acceder a tratamiento psicológico profesional. El estigma social, el miedo a la revictimización, la normalización de la violencia y la falta de redes de apoyo impiden que las víctimas busquen asesoría profesional tempranamente. El escenario descrito, induce al silencio prolongado, aislamiento y angustia, profundizando así el impacto del trauma (ONU Mujeres, 2023).

En este sentido, resulta fundamental analizar cómo se manifiesta el trastorno de estrés postraumático en mujeres víctimas de violencia sexual atendidas en espacios de atención psicológica. Comprender las características clínicas del TEPT en contextos locales permite visibilizar la magnitud del problema, identificar las necesidades específicas de esta población y fortalecer los procesos de evaluación e intervención psicológica desde una perspectiva clínica y de derechos humanos.

Por lo tanto, el presente estudio tiene como objetivo analizar el trastorno de estrés postraumático como consecuencia de la violencia sexual en mujeres atendidas en el Consultorio Psicológico de Portoviejo, con el fin de aportar evidencia empírica que contribuya a una mejor comprensión del impacto psicológico del trauma y al fortalecimiento de la atención psicológica dirigida a mujeres víctimas de violencia sexual.

## **Material y métodos**

La investigación se desarrolló bajo la dirección del enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo-correlacional y diseño no experimental de corte transversal. El estudio se sustentó en el método hipotético-deductivo, partiendo de supuestos teóricos relacionados con la presencia de sintomatología de trastorno de estrés postraumático en mujeres víctimas de violencia sexual, los cuales fueron contrastados empíricamente mediante la recolección y análisis de datos numéricos.

La muestra estuvo conformada por 15 mujeres adultas víctimas de violencia sexual, atendidas en el Consultorio Psicológico de Portoviejo. Las participantes fueron seleccionadas mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. Como criterios de inclusión se consideró ser mayor de edad, haber experimentado violencia sexual y encontrarse en proceso de atención psicológica al momento del estudio.

Para la recolección de información se utilizó la Lista de Verificación de Trastorno de Estrés Postraumático para el DSM-5 (PCL-5), instrumento de tamizaje compuesto por 20 ítems con escala tipo Likert, que permite evaluar la presencia e intensidad de síntomas asociados al trastorno de estrés postraumático. Adicionalmente, se aplicó una encuesta estructurada elaborada por la investigadora, orientada a evaluar el impacto psicológico percibido de la violencia sexual. La aplicación de los instrumentos se realizó de manera individual, en un ambiente privado y confidencial, garantizando condiciones adecuadas para la participación de las mujeres.

Los datos recolectados fueron organizados, codificados y analizados utilizando el programa Microsoft Excel. Se aplicó estadística descriptiva mediante el cálculo de frecuencias, porcentajes, medias y desviación estándar. Asimismo, se realizó análisis inferencial para evaluar la relación entre el impacto psicológico percibido de la violencia sexual y la sintomatología de estrés postraumático, empleando la prueba exacta de Fisher, considerando un nivel de significancia estadística de  $p < 0,05$ .

La investigación respetó los principios éticos fundamentales de la psicología. Todas las participantes firmaron un consentimiento informado, garantizándose la confidencialidad y el anonimato de la información proporcionada, así como el uso exclusivo de los datos con fines académicos y científicos. Durante el proceso se procuró evitar cualquier forma de revictimización, velando por el bienestar emocional de las participantes.

## Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación de la Lista de Verificación de Trastorno de Estrés Postraumático para el DSM-5 (PCL-5), con el fin de describir la presencia e intensidad de síntomas asociados al estrés postraumático en mujeres víctimas de violencia sexual atendidas en el Consultorio Psicológico de Portoviejo. Los resultados se interpretan de manera integrada según los criterios diagnósticos del DSM-5, considerando que el PCL-5 es un instrumento de tamizaje y no de diagnóstico clínico.

**Tabla 1**  
*Características sociodemográficas de las participantes (N = 15)*

| Variable                    | n  | %    |
|-----------------------------|----|------|
| Edad: 26–33 años            | 14 | 93,3 |
| Estado civil: soltera       | 8  | 53,3 |
| Nivel educativo: secundaria | 9  | 60,0 |
| Ocupación: desempleada      | 6  | 40,0 |

La muestra estuvo conformada por mujeres adultas jóvenes, predominantemente solteras y con nivel educativo secundario y situación laboral inestable, lo que evidencia condiciones de vulnerabilidad social asociadas a la población estudiada.

**Tabla 2**  
*Estadísticos descriptivos del PCL-5*

| <b>N</b> | <b>Puntaje mínimo</b> | <b>Puntaje máximo</b> | <b>Media</b> | <b>DE</b> |
|----------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 15       | 18                    | 27                    | 24,0         | 2,9       |

Se observa que la puntuación media del PCL-5 fue de 24 puntos, con valores que oscilaron entre 18 y 27, lo que indica la presencia de sintomatología asociada al trastorno de estrés postraumático en niveles moderados, con variabilidad en la intensidad de los síntomas entre las participantes.

Luego de la presentación de los estadísticos descriptivos del PCL-5, se analizó la distribución de los síntomas de acuerdo con los criterios diagnósticos del DSM-5. En relación con los síntomas de reexperimentación, correspondientes al criterio B, la mayoría de las participantes reportó la presencia de recuerdos intrusivos, malestar psicológico intenso y reacciones fisiológicas asociadas a la experiencia de violencia sexual, predominantemente en niveles moderados.

Respecto a los síntomas de evitación, vinculados al criterio C, se observó que una proporción considerable de las participantes manifestó evitación persistente de pensamientos, recuerdos y estímulos relacionados con el evento traumático, principalmente en niveles leves a moderados.

En cuanto a las alteraciones cognitivas y del estado de ánimo, correspondientes al criterio D, los resultados evidenciaron la presencia de creencias negativas persistentes, sentimientos de culpa o vergüenza y dificultades para experimentar emociones positivas, lo que refleja un impacto emocional sostenido posterior al evento traumático.

Finalmente, los síntomas de activación e hiperalerta, asociados al criterio E, se manifestaron mediante irritabilidad, hipervigilancia y alteraciones del sueño, predominando niveles leves en la mayoría de las participantes.

**Tabla 3**  
*Relación entre el impacto psicológico percibido de la violencia sexual y el nivel de síntomas de estrés postraumático*

| <b>Impacto psicológico percibido</b> | <b>n</b> | <b>Media PCL-5</b> | <b>DE</b> |
|--------------------------------------|----------|--------------------|-----------|
| Poco impacto                         | 6        | 21,3               | 2,1       |
| Impacto moderado                     | 9        | 25,6               | 2,8       |

Los resultados muestran que las participantes que percibieron un mayor impacto psicológico de la violencia sexual presentaron con mayor frecuencia síntomas moderados de estrés postraumático. No obstante, la asociación entre ambas variables no alcanzó significancia estadística, lo cual puede estar relacionado con el tamaño reducido de la muestra.

## **Discusión**

Los resultados de este estudio permitieron analizar el trastorno de estrés postraumático como consecuencia de la violencia sexual en mujeres atendidas en el Consultorio de Portoviejo, lo cual concuerda con el objetivo general establecido. Los hallazgos indicaron que todas las participantes presentaban síntomas relacionados con el TEPT, pero ninguna alcanzó el umbral clínico para un diagnóstico formal.

En relación con la evaluación mediante la Lista de Verificación de Trastorno de Estrés Postraumático para el DSM-5 (PCL-5), la puntuación arrojada refleja síntomas moderados, con una media de 24 puntos. Este resultado indica que, si bien las participantes no cumplían plenamente los criterios diagnósticos del DSM-5 (APA, 2022), sí presentaban manifestaciones psicológicas relacionadas con su experiencia traumática. Estos hallazgos coinciden con los de Guerrero et al. (2021), quienes señalaron que la violencia sexual, incluso si no cumple todos los criterios diagnósticos clínicos, es un evento altamente perturbador capaz de causar un malestar psicológico significativo.

En los diversos ítems del PCL-5, las respuestas “algo” y “moderado” fueron preponderantes, lo que indica la presencia de síntomas como malestar emocional, activación fisiológica y reacciones psicológicas persistentes. Estos resultados concuerdan con lo referido por Delia et al. (2022), quienes señalaron que la agresión sexual produce alteraciones en los sistemas biológicos y neuropsicológicos encargados de la regulación del estrés, incrementando la vulnerabilidad a desarrollar sintomatología postraumática sostenida en el tiempo.

Además, los resultados de la encuesta sobre violencia sexual revelaron que el 100 % de las encuestadas había experimentado este tipo de violencia, lo que destaca la recurrencia de este comportamiento y el hecho de que los agresores suelen ser conocidos como familiares y parejas. Esta afirmación es significativa, ya que Lozano et al. (2020) manifiestan que la violencia sexual perpetrada por personas cercanas genera una afectación emocional más profunda, al implicar una ruptura del vínculo de confianza y un aumento de sentimientos de indefensión y culpa, factores estrechamente relacionados con el desarrollo del TEPT.

Asimismo, la ocurrencia de los hechos en áreas cotidianas, como el espacio público, el hogar o la institución educativa, puede contribuir a la persistencia del malestar psicológico, al dificultar la percepción de seguridad en entornos habituales. Esta situación coincide con lo descrito por Oyola et al. (2020), quienes indican que las mujeres víctimas de violencia sexual suelen desarrollar conductas de evitación como respuesta al malestar generado por la reexperimentación del trauma, afectando su funcionamiento social, emocional y relacional.

En cuanto a los factores de protección, se observó que algunas participantes recibieron atención psicológica o médica posterior a los hechos y contaron con apoyo social al compartir su experiencia con personas de confianza. Estos elementos podrían explicar que los niveles de estrés postraumático se mantengan en un rango moderado y no alcancen niveles severos, tal como señalan Hernández (2021) y Soto et al. (2022), quienes destacan la importancia de la intervención terapéutica temprana para la reducción de la sintomatología postraumática.

Finalmente, al relacionar la frecuencia de los eventos de violencia sexual con el impacto percibido en el bienestar psicológico actual, se evidenció que las mujeres que reportaron mayor recurrencia de agresiones y un impacto moderado presentaron con mayor frecuencia síntomas asociados al estrés postraumático. Este hallazgo refuerza lo planteado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), al reconocer la violencia sexual como un grave problema de salud pública con consecuencias significativas en la salud mental de las mujeres.

En común, los resultados corroboran que la violencia sexual constituye un factor determinante en el desarrollo de sintomatología asociada al trastorno de estrés postraumático, incluso cuando no se alcanza un diagnóstico clínico formal. Esto resalta la necesidad de fortalecer los servicios de atención psicológica especializada y de promover estrategias de intervención integral orientadas a la recuperación emocional y al restablecimiento del bienestar psicológico de las mujeres víctimas de violencia sexual.

## **Conclusiones**

Los resultados obtenidos mediante la aplicación del PCL-5 evidencian la presencia de sintomatología compatible con Trastorno de Estrés Postraumático en las mujeres víctimas de violencia sexual atendidas en el consultorio psicológico de Portoviejo, predominando niveles de afectación moderada, lo que confirma el impacto psicológico significativo de este tipo de violencia.

El análisis de los síntomas permitió identificar que las dimensiones de reexperimentación, evitación y alteraciones cognitivas emocionales se presentan de manera frecuente en la muestra estudiada, lo cual coincide con la literatura científica que describe al TEPT como una de las principales consecuencias de la violencia sexual en mujeres.

A partir del desarrollo integral del estudio, se concluye que la evaluación psicológica sistemática mediante instrumentos validados, como el PCL-5, constituye una herramienta fundamental para la detección oportuna del TEPT y para la planificación de intervenciones clínicas adecuadas en contextos de atención psicológica.

### **Recomendaciones**

Se recomienda que los centros de atención psicológica incorporen de manera rutinaria instrumentos estandarizados para la evaluación del Trastorno de Estrés Postraumático en mujeres víctimas de violencia sexual, con el fin de favorecer diagnósticos tempranos y precisos.

Es pertinente fortalecer los programas de intervención psicológica especializada en trauma, orientados a la reducción de los síntomas del TEPT, considerando enfoques terapéuticos basados en la evidencia científica.

Para futuras investigaciones, se sugiere ampliar el tamaño de la muestra e incluir diseños metodológicos longitudinales que permitan analizar la evolución de los síntomas del TEPT a lo largo del tiempo y evaluar la efectividad de las intervenciones psicológicas implementadas.

## **Referencias bibliográficas**

- Agüero, C., Torres, D. y Olivas, L. (2024). Trastorno de estrés postraumático y depresión en mujeres con signos de violencia doméstica en Lima Metropolitana, Perú. *Scielo. Revista de Investigación en Psicología*, 27(2). [http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1609-74752024000200002&script=sci\\_artext&tlng=es](http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1609-74752024000200002&script=sci_artext&tlng=es)
- Alves, A., Litao, M., Sani, A., y Moreira, D. (2024). Impacto del abuso sexual en el trastorno de estrés postraumático en niños y adolescentes: una revisión sistemática. *Social Sciences*, 13(4), 189. <https://www.mdpi.com/2076-0760/13/4/189>
- Asociación Americana de Psiquiatría (APA). (2022). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (5a ed., texto revisado). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. <https://www.federaciocatalanadah.org/wp-content/uploads/2018/12/dsm5-manualdiagnosticoestadisticodelostrastornosmentales-161006005112.pdf>
- D'elia, A., Juruena, M., Coimbra, B., Mello, M. y Mello, A. (2022). Aumento de mediadores inmunoinflamatorios en mujeres con trastorno de estrés postraumático después de una agresión sexual: seguimiento de 1 año. *Elsevier. Revista de investigación psiquiátrica*, 155, 241-251. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022395622004812>
- D'Elia, T., Juruena, M., Coimbra, B., Mello, M., y Mello, A. (2022). Aumento de mediadores inmunoinflamatorios en mujeres con trastorno de estrés postraumático después de una agresión sexual: seguimiento de 1 año. *Pubmed*. 155, 241-251. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36113394/>
- Hernández, N. (2021). *EFEECTO DE UN PROTOCOLO BASADO EN LA TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO EN LA SINTOMATOLOGÍA DE ESTRÉS POSTRAUMA DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL* [Tesis de Maestría, Fundación Universitaria Konrad Lorenz]. <https://repositorio.konradlorenz.edu.co/server/api/core/bitstreams/c9254722-ba96-4d5e-a73a-386f29653513/content>
- Guerrero, D., García, D., Peñafiel, D., Villavicencio, L. y Flores, V. (2021). Trastorno de estrés postraumático en mujeres víctimas de violencia. Una revisión. *Dialnet*, 7(3), 667-688. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8229667>
- Lozano, J., Gómez, M., Avilés, C. y Sepúlveda, A. (2020). Sintomatología del trastorno de estrés postraumático en una muestra de mujeres víctimas de violencia sexual. *Scielo*.

- Cuadernos de Medicina Forense*, 23(3-4), 82.  
[https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1135-76062017000200082](https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062017000200082)
- Pérez, A. y Rodríguez, A. (2024). La violencia contra la mujer, una revisión sistematizada. *Universitas*, XXI, 40, 139-158.  
<https://www.redalyc.org/journal/4761/476176952011/html/>
- Sarmiento, D. (2023). Efectos del estrés postraumático sobre la neurobiología y el funcionamiento neuropsicológico de mujeres víctimas de violencia sexual: Una revisión sistemática [Trabajo de Grado, Universidad de la Costa].  
<https://repositorio.cuc.edu.co/server/api/core/bitstreams/5c403ca3-fd75-40b1-a4dc-ca8578eabea4/content>
- Soto, W., Zarco, D., López, S., Guzmán, G., y Herrera, J. (2022). Eficacia de una intervención cognitivo-conductual de inoculación al estrés para la disminución de TEPT en mujeres víctimas de abuso sexual en Hidalgo. *Boletín Científico de la Escuela Superior Atotonilco de Tula*, 9(17).  
<https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/atotonilco/article/view/8145>
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021). Violencia contra la mujer.  
<https://www.who.int/es/health-topics/violence-against-women>.
- Oyola, L., Gómez, G., Carvajal, I. y García, S. (2020). Sintomatología del trastorno de estrés postraumático en una muestra de mujeres víctimas de violencia sexual. *Scielo. Cuadernos de Medicina Forense*, 23(3-4), 82-91.  
[https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1135-76062017000200082](https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062017000200082)

**Conflicto de intereses:**

Los autores declaran que no existe conflicto de interés posible.

**Financiamiento:**

No existió asistencia financiera de partes externas al presente artículo.

**Agradecimiento:**

N/A

**Nota:**

El artículo no es producto de una publicación anterior.



Revista Multidisciplinaria Arbitrada de Investigación Científica  
ISSN: 2588 - 0659

CER-MQRinvestigar-UIO-V\_10\_1\_ART\_171  
Quito (Ecuador), 2026-03-16

CERTIFICATION

MQR® editorial certifies, that this article:

**Post-traumatic stress disorder in women victims of sexual violence at the Portoviejo Psychological Clinic.**

**Trastorno De Estrés Postraumático En Mujeres Víctimas De Violencia Sexual Del Consultorio Psicológico De Portoviejo.**

PEER REVIEW - "Aceptada para su publicación después de superar un proceso de doble revisión ciega externa"

Fechas de recepción: 20-FEB-2026 aceptación: 16-MAR-2026 publicación: 31-MAR-2026

Authors:

Navarrete-Mera, Sandy Lilibeth  
UNIVERSIDAD ESTADAL DE MILAGRO  
Maestrante de Psicología Clínica Mención en  
Atención  
en Emergencias y Desastres  
Portoviejo – Ecuador



[snavarrem3@unemi.edu.ec](mailto:snavarrem3@unemi.edu.ec)



<https://orcid.org/0009-0009-4824-7647>

Mgtr. Anclundia-Mendoza, María Noemi  
UNIVERSIDAD ESTADAL DE MILAGRO  
Docente de la Facultad de Educación  
Milagro – Ecuador



[malchundiam@unemi.edu.ec](mailto:malchundiam@unemi.edu.ec)



<https://orcid.org/0000-0002-5619-3660>

Published:

Vol. 10 Núm. 1 (2026): Revista Científica MQRinvestigar: pag. 01-13.

DOI: <https://doi.org/10.56048/MQR.2026.e171>

Indexado en Latindex 2.0 ISSN-L 2588-0659




<http://www.investigarmqr.com/>

Cordially yours,  
MQRInvestigar - Director



Firmado electrónicamente por:  
MARCO ANTONIO  
QUINTANILLA  
ROMERO



Núñez de Vela E256 - Quito /Ecuador - CP: 170135 - WhatsApp +593 99 83 96 831 [www.investigarmqr.com](http://www.investigarmqr.com) - [mqr@investigarmqr.com](mailto:mqr@investigarmqr.com)

# UNEMI

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

*¡Evolución académica!*

@UNEMIEcuador

